

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**Реферат**  
**по курсу**  
**«Введение в космофизику»**

**Суперсимметрия, локальное горизонтальное объединение и  
попытка решения проблемы ароматов**

Выполнил  
студент группы М21-115

\_\_\_\_\_ А. И. Дуров

Проверил  
преподаватель, д.ф.-м.н.

\_\_\_\_\_ М. Ю. Хлопов

Москва 2022

# Оглавление

Введение . . . . .	2
Подавление D-членных расщеплений масс в присутствии допол- нительной группы $U(1)$ . . . . .	4
Реалистичная модель массы фермионов и иерархий смешивания .	7
Решение проблемы суперсимметричного аромата . . . . .	9
Заключение . . . . .	11
<b>Список использованных источников</b>	<b>13</b>

# Введение

Одной из фундаментальных загадок стандартной модели является непонимание массы фермиона и иерархий смешивания. Одним из подходов к решению этой проблемы является использование горизонтальных симметрий, как глобальных, так и локальных, которые преобразуют фермионы одного поколения в другое. Тот факт, что в «пределе исчезающих связей Юкавы» стандартная модель обладает  $SU(3)_L^q \times SU(3)_R^u \times SU(3)_R^d \times SU(3)_L^l \times SU(3)_R^e \times U(1)_{B-L}$  горизонтальной симметрией, делает этот подход вполне правдоподобным.

Далее будут вестись рассуждения о локальной реализации горизонтальных симметрий. Одним из существенных отличий локальных симметрий от глобальных состоит в том, что глобальные (но не локальные) симметрии часто подвергаются нарушению из-за квантовых гравитационных эффектов.

Наличие суперсимметрии накладывает дополнительные ограничения на модели с локальными горизонтальными симметриями [1]. Например, если выбрать общую простую неабелеву группу  $G$  как локальную горизонтальную симметрию, при наличии нарушения суперсимметрии,  $D$ -члены (примечание: каждое суперполе может быть расширено относительно новых фермионных координат (причем общий вид суперполей зависит от всех этих координат), а последний член в соответствующем расширении и называется  $D$ -членом)[2], связанные с этой группой  $G$ , будут вызывать расщепление между массами слептона и скварка разных поколений (примечание: слептоны и скварки - гипотетические суперсимметричные частицы-партнеры к лептонам и кваркам). Они вызывают эффекты нейтрального тока, изменяющих аромат [3]. Поскольку скварковые расщепления масс не зависят от горизонтальных калибровок и пока горизонтальная группа является простой, нет свободного параметра, который позволил бы значительно уменьшить эти расщепления. Это создает проблему использования локальных горизонтальных симметрий как способа понимания иерархии масс фермионов в суперсимметричном контексте.

Также стоит отметить следующее явление: массовые параметры хиггсовского потенциала меняются при переходе к суперсимметрии. А именно

- Хиггс может приобрести отрицательный знак у массового члена. Как результат, при некоторых значениях коэффициентов у потенциала появляется нетривиальный минимум. Это вызывает спонтанное нарушение  $SU(2)$  калибровочной симметрии. Вакуумные средние хиггсовских полей приобретают ненулевые значения, что обеспечивает массы частицам, а суперпартнеры к частицам получают соответствующие добавки к массам [4].

Если бы D-членные скварковые расщепления масс (или слептоновые) отсутствовали, локальные горизонтальные симметрии могли бы решить проблему аромата в SUSY (SUperSYmmetry), которая преследует общую нарушаемую суперсимметричную стандартную модель. Явным преимуществом является тот факт, что не нужно делать никаких специальных предположений о потенциале Келера (или суперпотенциале - такие функции в суперсимметричной квантовой механике, с помощью которых можно вывести потенциалы для суперсимметричных партнеров), кроме требования калибровочной инвариантности. Ранее были предприняты два различных подхода, которые позволяют избежать вышеупомянутой трудности с D-членом: первое - предположение, что горизонтальная симметрия является глобальной, или второе - использование дискретной калибровочной симметрии. В обоих случаях нет связанных D-членов.

В данной работе описывается решение «проблемы D-члена», которое позволило бы использовать истинные калибровочные симметрии для одновременного решения проблемы массы фермиона и проблемы суперсимметричного аромата [5]. Показывается, что, присоединив группу  $U(1)$  как локальную симметрию к существующей неабелевой горизонтальной группе  $G$ , можно рассмотреть массовые расщепления между различными поколениями скварков, вызванные D-членами. Разделение массы теперь будет квадратично зависеть от соотношения двух калибровочных выражений, которое может быть скорректировано таким образом, чтобы сделать эффекты FCNC (Flavor-Changing Neutral Current) достаточно малыми. Этот механизм будет проиллюстрирован на примере горизонтальной модели  $SU(2)_H \times U(1)_H$ . Затем будет описано построение полностью реалистичной модели, используя эту группу, и показано, как фактор  $U(1)$  может быть отождествлен с аномальной группой  $U(1)$ , возникающей при компактификации су-

перструн (примечание: компактификация - операция, которая преобразует топологические пространства в компактные). Эта модель вполне предсказуема в нейтринном, а также в кварковом и лептонном секторах. В частности, она может быть использована при рассмотрении нейтринных колебаний: по большим углам - для атмосферных нейтрино и по малым углам - для солнечных нейтрино [6]. Модель может быть отброшена, если редкий распад  $\mu \rightarrow e\gamma$  не будет наблюдаться в рассматриваемом эксперименте. Кроме того, группа, соответствующая данной модели может быть легко объединена в группу  $SU(5)$  или  $SO(10)$ .

## Подавление D-членных расщеплений масс в присутствии дополнительной группы $U(1)$

Рассмотрим калибровочную группу теории как  $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y \times G_H$ , где горизонтальная группа  $G_H$  выбрана как  $SU(2)_H \times U(1)_H$ , как было указано ранее. Выберем строение модели такой же, как и в MSSM, с добавлением трех правых нейтрино (обозначаемых  $\nu_i^c$ ). Эти поля  $\nu_i^c$  необходимы для устранения «аномалии треугольника» (нарушения квантовыми эффектами, связанными с топологией, симметрии классической теории) и глобальной  $SU(2)_H$  аномалии. Следствием этого является то, что левые нейтрино будут иметь небольшие массы, индуцируемые seesaw-механизмом. Горизонтальные квантовые числа выбраны в соответствии с тем предположением, что частицы первых двух поколений принадлежат к дублетам группы  $SU(2)_H$ , тогда как частицы третьего поколения находятся в синглетном представлении. Кроме того, мы вводим условие унифицируемости, которое означает, что все 16 членов поколения имеют одинаковые горизонтальные заряды. Таким образом:

$$\{Q_a, L_a, u_a^c, d_a^c, e_a^c, \nu_a^c\} : 2(-1) \quad (1)$$

$$\{Q_3, L_3, u_3^c, d_3^c, e_3^c, \nu_a^3\} : 1(0)$$

где показаны квантовые числа  $SU(2)_H \times U(1)_H$ . Здесь  $a = 1 - 2$  - это индекс  $SU(2)_H$ . Сектор Хиггса состоит из следующих полей:

$$\{H_u, H_d\} : 1(0); \phi_a : 2(1); \bar{\phi}_a : 2(-1); \chi : 1(1); \bar{\chi} : 1(-1); S_i : 1(0) (i = 1 - 2) \quad (2)$$

Здесь  $H_u, H_d$  являются обычными полями дублета MSSM, в то время как все остальные поля являются синглетами стандартной модели. Учитывая группу горизонтальной симметрии  $G$ , эта система Хиггса является минимальным выбором, который может правильно разбить группу  $G$  без нарушения суперсимметрии. Поля  $(\phi, \bar{\phi})$  разделяют  $SU(2)_H$ , в то время как поля  $(\chi, \bar{\chi})$  разделяют  $U(1)_H$ . Поля  $S_i$  необходимы для того, чтобы разрешить кубические члены в суперпотенциале, что является требованием, если горизонтальная калибровочная симметрия должна быть нарушена в суперсимметричном пределе только перенормируемыми членами.

Продemonстрируем, как в этой модели возникает подавление расщепления массы D-члена между скварками разных поколений (и слептонами). В этой конкретной модели проблема касается D-членов для  $SU(2)_H$ , которые потенциально могут разделить массы первых двух поколений. Также важно, что D-член для  $U(1)_H$  не вызовет массового расщепления в первых двух поколениях. Наиболее общий суперпотенциал, включающий поля Хиггса, имеет вид:

$$W = \mu_\phi \phi \bar{\phi} + \lambda \phi \bar{\phi} S_1 + W'(\chi \bar{\chi}, S_i) \quad (3)$$

где отсутствует явная форма фрагмента  $W'$ , включающего поля  $(\chi \bar{\chi}, S_i)$ . В суперсимметричном пределе мы имеем  $\langle \phi \rangle = \langle \bar{\phi} \rangle \equiv V_\phi$  и  $\langle \chi \rangle = \langle \bar{\chi} \rangle \equiv V_\chi$ . Делается предположение, что масштаб нарушения горизонтальной симметрии  $(V_\phi, V_\chi)$  намного больше, чем масштаб условий нарушения суперсимметрии. Требование обращения в нуль F-членов в суперсимметричном пределе подразумевает  $F_\phi = (\mu_\phi + \lambda S_1) \bar{\phi}$  и  $F_S = \lambda \phi \bar{\phi} + \delta W'/_1 = 0$ . Включая произвольное нарушение суперсимметрии, скалярный потенциал, включающий поля  $(\phi, \bar{\phi})$ , задается отдельным выражением. А минимизируя этот потенциал относительно полей  $\phi$  и  $\bar{\phi}$  и вычитая два условия экстремизации, мы приходим к соотношению:

$$(|\bar{\phi}|^2 - |\phi|^2) \left[ \frac{\lambda^*}{\phi\bar{\phi}} (\lambda\phi\bar{\phi} + \delta W'/\delta S) - \frac{1}{4}(g_{2H}^2 + 4g_{1H}^2) + B_\phi\mu_\phi + A_\phi\lambda S \right] = (m_\phi^2 - m_{\bar{\phi}}^2) \quad (4)$$

В итоге вклад в расщепление массы скварка (или слептона) от D-члена определяется следующим образом:

$$\Delta m_{\bar{q}}^2 \cong \frac{g_{2H}^2}{g_{2H}^2 + 4g_{1H}^2} (m_\phi^2 - m_{\bar{\phi}}^2) \quad (5)$$

Стоит обратить внимание, что в отсутствие  $U(1)_H$ , группа H (т.е., если  $g_{1H} = 0$ ),  $\delta m_{barq}^2 \simeq m_\phi^2 m_{\bar{\phi}}^2$ , которая не зависит от калибровочной связи и является произвольной (т.е. любой между  $(100GeV)^2$  и  $(1000GeV)^2$ ). Хотя эти D-члены вносят вклад в диагональные массы скварков, поскольку они не универсальны, как только производится вращение Кабиббо на кварковых полях, они вносят вклад в процессы изменения аромата [7]. Наиболее строгие ограничения возникают из-за смешивания  $K^0 - \bar{K}^0$  и редкого распада  $\mu \rightarrow e\gamma$ . Разница масс  $K_L - K_S$  устанавливает ограничение (из оператора (LL)(RR), оказывающего наибольшее влияние)  $[\delta m_{\bar{q}}^2/m_{\bar{q}}^2]\theta_C \leq 1 \times 10^{-3} (m_{\bar{q}}/500GeV)$ , где  $m_{\bar{q}}$  обозначает среднеквадратичную массу. Ограничение, возникающее из  $\mu \rightarrow e\gamma$ , аналогично. Очевидно, что если  $g_{1H} \rightarrow 0$ , то расщепление D-члена будет грубо противоречить экспериментам, если среднеквадратичные массы будут ниже ТэВ. С другой стороны, при наличии дополнительного калибровочного выражения  $g_{1H}$  строение будет выглядеть по-иному.

Для  $m_{\bar{q}} \sim (300 - 500)GeV$  модель согласуется с экспериментами. Важно, что массы скварков действительно находятся ниже  $V_\phi$  и в этом процессе получают универсальный вклад аромата от гаутино (или «gaugino» - это гипотетический фермионный квант суперсимметричного поля (т.е. - суперпартнер) калибровочного поля, предсказанный калибровочной теорией в сочетании с суперсимметрией)[8]. Для сопоставимых значений начальных (по шкале Планка) масс gaugino и скварка коэффициент  $m_\phi^2/m_{\bar{q}}^2$  уменьшается примерно на  $\sim 1/10$ .

Несмотря на использование конкретного примера для решения проблемы D-члена, его особенности преобладают в более общих случаях. На-

пример, можно использовать альтернативные суперпотенциалы, такие как  $W = \lambda S_1(\phi\bar{\phi}\mu^2) + W'$  или такой суперпотенциал, который включает неперенормируемые операторы [9]. Проблема FCNC в отсутствие  $U(1)_H$  и ее решение через  $U(1)_H$  будут идентичны случаю, описанному выше.

## Реалистичная модель массы фермионов и иерархий смешивания

Далее будет показано, что модель, описанная в предыдущем разделе, может естественным образом объяснить массу фермиона и иерархию смешивания. Будем следовать той точке зрения, что в лагранжиане разрешены все операторы, согласующиеся с калибровочной инвариантностью. Это включает в себя неперенормируемые операторы, которые при последующих вычислениях будут подавлены соответствующими членами, включающими в себя коэффициенты, обратнопропорциональные степеням планковской массы. Предполагается, что все коэффициенты таких операторов имеют порядок единицы.

Сначала будет рассмотрен кварковый сектор теории. Общий суперпотенциал, согласующийся с симметрией  $SU(2)_H \times U(1)_H$ , задается:

$$\begin{aligned} W_{Yuk} = & h_{33}^u Q_3 u_3^c H_u + h_{33}^d Q_3 d_3^c H_d + \frac{h_{23}^u}{M} \epsilon^{ab} Q_a u_3^c H_u \phi_b + \frac{h_{23}^d}{M} \epsilon^{ab} Q_a d_3^c H_d \phi_b + \\ & + \frac{h_{32}^u}{M} \epsilon^{ab} Q_3 u_a^c H_u \phi_b + \frac{h_{32}^d}{M} \epsilon^{ab} Q_3 d_a^c H_d \phi_b + \frac{h_{22}^u}{M^2} Q_a u_b^c H_u \phi_p \phi_q \epsilon^{ap} \epsilon^{bq} + \\ & + \frac{h_{22}^d}{M^2} Q_a d_b^c H_d \phi_p \phi_q \epsilon^{ap} \epsilon^{bq} + \frac{h_{12}^u}{M^2} \epsilon^{ab} Q_a u_b^c H_u \chi^2 + \frac{h_{12}^d}{M^2} \epsilon^{ab} Q_a d_b^c H_d \chi^2 \quad (6) \end{aligned}$$

Также можно получить следующую иерархическую матрицу масс как для верхнего, так и для нижнего секторов:

$$M_f = v_f \begin{pmatrix} 0 & h_{12}^f \epsilon_\chi^2 & 0 \\ -h_{12}^f \epsilon_\chi^2 & h_{22}^f \epsilon_\phi^2 & h_{23}^f \epsilon_\phi \\ 0 & h_{32}^f \epsilon_\phi & h_{33}^f \end{pmatrix} \quad (7)$$

с  $f = u, d$ . Матрица массы заряда лептона имеет идентичную форму, как и матрица массы нейтрино Дирака (если определить  $f = l, \nu$  для двух



случаев).

Матрицы масс естественным образом объясняет иерархию масс фермиона и угла смешивания. Далее, предположим, что все параметры  $h_{ij}$  имеют первый порядок. Массовые соотношения в секторе нижних кварков затем задаются формулой:

$$m_s/m_b \sim \epsilon_\phi^2, m_d/m_s \sim \epsilon_\chi^4 \epsilon_\phi^4 \quad (8)$$

с аналогичными результатами в секторах верхнего кварка и заряженного лептона. Если выбрать  $\epsilon_\phi \cong 1/7$  и  $\epsilon_\chi \cong 1/20$ , все наблюдаемые массы и углы смешивания могут быть объяснены, при этом коэффициенты  $h_{ij}$  принимают значения в диапазоне  $(1/2 - 2)$ . Это значительное улучшение по сравнению со стандартными моделями Юкавы, которые охватывают примерно шесть порядков величины. В данной системе, различия первого порядка, такие как в  $m_\mu/m_\tau$  и  $m_s/m_b$  (отличаются примерно в 3 раза по шкале Планка), объясняются различиями первого порядка в параметрах  $h_{ij}$ . Иерархия  $m_b/m_t$  требует умеренных или больших значений  $tg\beta \sim 10 - 40$ .

Переходя теперь к лептонному сектору, как уже отмечалось, матрицы масс заряженного лептона и нейтрино Дирака имеют идентичные формы, как было показано в уравнении (7). Соответствующая массовая матрица Майораны получается из лагранжиана:

$$\begin{aligned} L^{\nu^c} = & f_{33} \nu_3^c \nu_3^c \Delta + \frac{f_{23}}{M} \epsilon^{ab} \nu_a^c \nu_3^c \Delta \phi_b + \frac{f_{22}}{M^2} \nu_a^c \nu_b^c \Delta \phi_p \phi_q \epsilon^{ap} \epsilon^{bq} + \\ & + \frac{f_{13}}{M^3} \epsilon^{ab} \nu_a^c \nu_3^c \Delta \bar{\phi}_b \chi^2 + \frac{f_{12}}{M^4} \nu_a^c \nu_b^c \Delta \bar{\phi}_p \bar{\phi}_q \epsilon^{ap} \epsilon^{bq} \chi^2 + \frac{f_{11}}{M^6} \nu_a^c \nu_b^c \phi_p \bar{\phi}_q \epsilon^{ap} \epsilon^{bq} \chi^4 \quad (9) \end{aligned}$$

На уровне стандартной модели для соответствующей массы Майораны будет опущен простой массовый член. Выдвигается предположение, что это возникает из-за VEV (Vacuum expectation value) поля  $\delta$ , которое нарушает В - L симметрию. Когда модель встроена в лево-правую симметричную структуру или  $SO(10)$ , или если измеряется В-L симметрия модели в ее нынешнем виде, майорановские массы полей  $\nu^c$  потребуют VEV для такого мультиплетта [10].

Из-за сложности seesaw-диагонализации можно сохранить наименьшие не обращающиеся в нуль члены во всех элементах матрицы Майораны, которая задается:

$$M_{\nu^c} = < \Delta > \begin{pmatrix} f_{11}\epsilon_\phi^2\epsilon_\chi^4 & f_{12}\epsilon_\phi^2\epsilon_\chi^2 & f_{13}\epsilon_\phi\epsilon_\chi^2 \\ f_{12}\epsilon_\phi^2\epsilon_\chi^2 & f_{22}\epsilon_\phi^2 & f_{23}\epsilon_\phi \\ f_{13}\epsilon_\phi\epsilon_\chi^2 & f_{23}\epsilon_\phi & f_{33} \end{pmatrix} \quad (10)$$

## Решение проблемы суперсимметричного аромата

Представленная здесь модель также имеет встроенное решение проблемы суперсимметричного аромата. На самом деле, частью мотивации использования горизонтальной симметрии и было, по сути, решением этой проблемы. Поскольку горизонтальная симметрия локальна, от квантовых гравитационных эффектов не ожидается явного нарушения. Как уже обсуждалось (см. разд. 2), усиливающая горизонтальную симметрию группа по коэффициенту  $U(1)$  уменьшает нарушение аромата, возникающее из-за горизонтальных  $SU(2)_H$  D-членов. Однако нарушение аромата в секторе скварков (и слептонов) появится только тогда, когда будет устранено нарушение горизонтальной симметрии. Далее будет показано, что такие нарушения являются допустимыми и согласуются с существующими ограничениями FCNC.

Предполагаем, что нарушение суперсимметрии происходит в скрытом секторе и передается в сектор MSSM с помощью супергравитации. Однако далее не будет сделано никаких специальных предположений о потенциале Келера (или суперпотенциале). В частности, не предполагается, что скалярные массы универсальны или что трилинейные A-члены, нарушающие суперсимметрию, пропорциональны суперпотенциальным связям Юкавы. Скалярные массы возникают из общих потенциальных членов Келера. Для скварков первых двух поколений доминирующий вклад приходится на:

$$L = \int d^4\theta Q_a^\dagger Q_a \frac{z^* z}{M_{Planck}^2} \quad (11)$$

где  $z$  – поле скрытого сектора (спурион, примечание: это фиктивное вспомогательное поле в квантовой теории поля, которое может использоваться для параметризации любого нарушения симметрии и определения всех операторов, инвариантных относительно симметрии) с ненулевой F-составляющей, нарушающей суперсимметрию. Идентифицируя  $F_z^2/M_{Plank}^2 = M_{SUSY}^2$ , видно, что доминирующие массы для первых двух поколений универсальны вследствие горизонтальной симметрии  $SU(2)_H$ . Поправки для других случаев будут вытекать из таких терминов, как

$$L = \int d^4\theta (Q_a^\dagger \phi_a)(\phi_b^\dagger Q_b) \frac{z^* z}{M_{Plank}^4} \quad (12)$$

и аналогичный член с заменой  $\phi$  на  $\bar{\phi}$ . По сравнению с доминирующим вкладом, эти неуниверсальные члены подавляются коэффициентом  $\epsilon_\phi^2 \sim 2 \times 10^{-2}$ . Поскольку эти поправки вносят вклад в диагональные члены в матрице массы скварков, любой эффект FCNC потребует дополнительного угла смешивания кварков ( $\sim \theta_C \sim \sqrt{\frac{m_d}{m_s}} \cong 0.2$ ). Кроме того, как отмечалось ранее, эти неуниверсальные поправки уменьшаются примерно в 10 раз в секторе скварков за счет эффектов RGE, пропорциональных массе gaugino (главным образом - gluino). Удобно определить набор параметров  $\delta_{12}^d$  как отношение (1,2) элемента матрицы массы скварка к среднему квадрату массы скварка в базисе, где кварковые поля являются физическими. Затем оценивается  $(\delta_{12}^d)_{LL,RR} \sim (2 \times 10^{-2}) \times (0.2) \times (0.1) = 4 \times 10^{-4}$ . Это следует сравнить с экспериментальным пределом для этой величины  $(\delta_{12}^d)_{LL,RR} \leq 1 \times 10^{-3}$ , действительным для средней массы квадрата 500 ГэВ. Такой результат согласуется с экспериментом.

Аналогичное рассуждение в секторе слептонов первых двух поколений приводит к прогнозу, что  $(\delta_{12}^l)_{LL,RR \sim \epsilon_\phi^2 \theta_{e\mu}} \sim (2 \times 10^{-2}) \times (0.07) \sim 1.4 \times 10^{-3}$ . Здесь был принят угол смешивания  $e-\mu$  равным  $\sqrt{m_e/m_\mu} \sim 0.07$ , что соответствует матрице масс. Стоит обратить внимание, что в отличие от сектора скварков, нет значительного эффекта разбавления (поскольку слептоны нейтральны по цвету). Это число следует сравнить с ограничением из настоящего экспериментального предела для  $\mu \rightarrow e\gamma$ , которое соответствует  $(\delta_{12}^l)_{LL,RR} \leq (4.0 \times 10^{-3} - 1.8 \times 10^{-2}) m \sim 100$  ГэВ и для  $x \equiv m_{\tilde{\gamma}}^2/m_{\tilde{l}}^2$  в

диапазоне  $0,3 - 3$ . Хотя ограничение выполнено, вероятность для  $\mu \rightarrow e\gamma$  не может быть намного ниже текущего экспериментального предела. По оценкам, этот показатель не более чем в 100 раз ниже нынешнего предела, который вскоре будет протестирован.

Для суперсимметрии, нарушающей трилинейные  $A$ -члены, они возникают в моделях супергравитации, учитывающих суперсимметричные члены, таких как:

$$L = \int d^2\theta Q_3 d_3^c H_d \frac{z}{M_{Planck}} \quad (13)$$

Получающиеся коэффициенты трехлинейных скалярных членов имеют порядок  $M_{SUSY}$ . Горизонтальная калибровочная инвариантность подразумевает, что в данной модели структура  $A$ -членов идентична структуре суперпотенциала. Однако коэффициенты матрицы  $A$  не пропорциональны матрице Юкавы.  $A$  соответствующие получившиеся коэффициенты трехлинейных скалярных членов приведут к процессам FCNC. Мы оцениваем параметр  $(\delta_{12}^d)_{LR} \sim \epsilon_\chi^2 A v_d / m_q^2$ . Выбирая  $m_q = 500 GeV$  и при  $\beta = 30$  мы получаем  $(\delta_{12}^d)_{LR} \cong 3 \times 10^{-5}$ , что значительно ниже экспериментального предела для этого количества, возникающего в результате смешивания  $K^0 - \bar{K}^0$ . Аналогичная оценка будет справедлива для лептонного  $(\delta_{12}^l)_{LR,RL}$ . Для масс слептона в 500 ГэВ ограничение от  $\mu \rightarrow e\gamma$  равно  $(\delta_{12}^l)_{LR,RL} \leq 2 \times 10^{-5}$ . Видно, что ограничение довольно жесткое. Учитывая неизвестные коэффициенты первого порядка (или некоторую пропорциональность членов  $A$ ), можно прийти к выводу, что  $\mu \rightarrow e\gamma$  не может быть намного ниже текущего экспериментального предела. Поскольку коэффициенты  $\tilde{\mu}_L \tilde{e}_R$  и  $\tilde{\mu}_R \tilde{e}_L$  приблизительно одинаковы, ожидается, что мюоны обоих спиральностей будут участвовать в распаде, в отличие от эффектов великого объединения, где распад  $\mu_L \rightarrow e_R \gamma$  подавляется. Скорость распада  $\tau \rightarrow \mu \gamma$  оценивается на два порядка величины ниже текущих пределов.

## Заключение

Был описан способ избежать чрезмерных эффектов FCNC, вызванных  $D$ -членным разделением массы между скварками и слептонами разных поколений в моделях с локальными горизонтальными симметриями. Бы-

ла построена модель без аномалий с  $SU(2)_H \times U(1)_H$  в качестве локальной группы горизонтальной симметрии и показано, что это может привести к правильному пониманию наблюдаемых иерархий среди масс кварков и лептонов и их смешений. Также было показано, что модель обеспечивает одновременное решение проблемы суперсимметричного аромата. Без каких-либо дополнительных допущений эта модель также приводит к желаемой картине масс нейтрино и смешиваний; эта модель также может быть использована для рассмотрения нейтринных колебаний. Хотя нарушение аромата в модели описывается, оно не является ненаблюдаемым. Также предсказывается, что редкий распад  $\mu \rightarrow e\gamma$  будет близок к текущему экспериментальному пределу.

# Список литературы

1. Low energy supersymmetry phenomenology / H. Baer [et al.]. — 1995. — Mar.
2. *MARTIN S. P.* A SUPERSYMMETRY PRIMER // Perspectives on Supersymmetry. — WORLD SCIENTIFIC, 07/1998. — P. 1–98.
3. *Kulshreshtha D. S., Müller-Kirsten H. J. W.* Quantization of systems with constraints: The Faddeev-Jackiw method versus Dirac’s method applied to superfields // Phys. Rev. D. — 1991. — May. — Vol. 43, issue 10. — P. 3376–3383.
4. *Казаков Д. И.* СУПЕРСИММЕТРИЧНОЕ РАСШИРЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. — 2014.
5. *Babu K., Barr S.* Gauged SO(3) family symmetry and squark mass degeneracy // Physics Letters B. — 1996. — Oct. — Vol. 387, no. 1. — P. 87–98.
6. *Haxton W., Robertson R. H., Serenelli A. M.* Solar Neutrinos: Status and Prospects // Annual Review of Astronomy and Astrophysics. — 2013. — Aug. — Vol. 51, no. 1. — P. 21–61.
7. *Горбунов Д. С., Дубовский С. Л., Троицкий С. В.* Калибровочный механизм передачи нарушения суперсимметрии // Усп. физ. наук. — 1999. — Т. 169, № 7. — С. 705–736.
8. Prospects for electroweakino discovery at a 100 TeV hadron collider / S. Gori [et al.] // Journal of High Energy Physics. — 2014. — Dec. — Vol. 2014, no. 12.

9. *Cheng T.-P., Li L.-F., Gross D.* Gauge Theory of Elementary Particle Physics // Physics Today - PHYS TODAY. — 1985. — Dec. — Vol. 38.
10. *Babu K. S., Mohapatra R. N.* Supersymmetry, Local Horizontal Unification, and a Solution to the Flavor Puzzle // Physical Review Letters. — 1999. — Sept. — Vol. 83, no. 13. — P. 2522–2525.